

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA - SESSIONE 2013

A ciascun candidato viene consegnato un caso clinico di cui dovrà formulare per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e dovrà esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso, nel tempo massimo di 45 minuti.

A ciascun candidato viene consegnata una radiografia con problemi di chirurgia odontostomatologica da risolvere. Il candidato, leggendo la radiografia, deve scrivere:

- la descrizione di ciò che vede nella radiografia;
- l'inquadramento del problema diagnostico;
- l'eventuale tipo di terapia medica e/o chirurgica.

TRACCIA CASO CLINICO OGGETTO DELLA RELAZIONE: CHIUSURA CONSERVATIVA DI UN DIASTEMA INFERIORE

SVOLGIMENTO - Paziente di 27 anni, sesso femminile, presenta un diastema inferiore. Si è proceduto allo studio del caso valutando gli spazi sui modelli e considerando il rifiuto della paziente a qualsiasi terapia ortodontica convenzionale, si è deciso di intervenire con un approccio conservativo, minimamente invasivo allo scopo di chiudere il diastema e ripristinare una corretta guida dentale ed estetica con un ponte adesivo inferiore. Il paziente si presenta alla nostra osservazione per una riabilitazione protesica complessa, inoltre nel piano terapeutico è prevista la chiusura del diastema (spazio tra due denti) tra gli incisivi centrali inferiori. Il Diastema è lo spazio tra due elementi dentari.

Se le condizioni lo permettono questo spazio può essere chiuso con metodiche conservative, cioè senza applicare manufatti protesici o ortodontici.

Si usa una metodica conservativa che non prevede neanche la più superficiale preparazione dentaria attraverso strumenti rotanti. Nella fase di studio vengono prese le impronte delle arcate del paziente, dalle quali si ottengono dei modelli in gesso. Viene anche fatto uno studio sul colore degli elementi da ricostruire. Sul modello in gesso viene realizzata la modellazione in cera degli elementi conferendogli sin da subito la forme definitiva che dovranno avere alla fine della ricostruzione in resina composita.

Sul modello in gesso e corretto in cera viene realizzata una mascherina in silicone, che non sarà altro che il negativo della nostra modellazione. Questa maschera di silicone posizionata in bocca al paziente ci permetterà di riprodurre fedelmente la modellazione in cera direttamente a ridosso dei denti del paziente, utilizzando come già detto le resine composite di opportuno colore.

La terapia consigliata prevede:

- bite superiore piatto da portare sempre
- allineamento dell'arcata inferiore con lingualizzazione del 36, estrazione ottavi inferiori, intrusione front. infer., completata arcata inferiore
- ricostruzione oclusale del 26, anc. mx post. superiore, intrusione e retrazione frontali superiori, frenulectomia superiore, coronoplastica dei 12-22
- contenzione con ferula metallica da portare per tutta la vita.

RADIOGRAFIA DIASTEMA INFERIORE:

